

versatis®
Parche de lidocaína al 5%

ALIVIA DONDE DUELE

ASPECTOS **PRÁCTICOS**

USO DEL **PARCHE**

de lidocaína al 5%

Material exclusivamente para el profesional de la salud

M-VST-CL-02-25-0001

Su médico le ha prescrito un **parche analgésico de uso tópico.**

Lea atentamente esta información antes de aplicarlo:

Se le ha indicado este parche para tratar un problema doloroso de la piel llamado **dolor neuropático localizado**[1], que se caracteriza por molestias o síntomas localizados como **dolor quemante, lacerante o punzante**, asociado con algunas de las siguientes molestias o sensaciones[2] (como por ejemplo):



El parche de lidocaína se aplica **directamente en la piel donde siente dolor o molestias.** La lidocaína del parche penetra la piel e interfiere con la transmisión del dolor. Sentirá una sensación refrescante producida por el gel y el parche protegerá además su piel sensible[3].



El parche de lidocaína se aplica en la zona dolorosa durante 12 horas, luego se retira y se deja un período sin parche de 12 horas. Posteriormente se aplica un nuevo parche sobre el área dolorosa. El parche de lidocaína puede aplicarse de día o de noche según sea su preferencia[3].



En la mayoría de los casos se percibe un alivio inicial del dolor a partir del primer día (por el efecto de barrera del parche); **pero el efecto máximo de alivio se puede demorar de 2 a 4 semanas.** Si en ese tiempo no siente ningún alivio, consulte a su médico cómo proceder[3].

Consejos de Aplicación[3]

Antes de aplicar el parche de lidocaina en el área afectada, lea atentamente la información para el paciente contenida en el envase del parche.

- Identifique el área de la piel que presenta dolor o molestias. La piel debe estar limpia y seca. Si la piel tiene vellos, usted los debe cortar usando tijeras. **No los afeite.**
- No debe aplicarse el parche **en piel inflamada o lesionada,** como lesiones de herpes zoster activas, dermatitis atópica o heridas.
- Pueden aplicarse cremas y lociones sobre el área afectada de la piel durante el período en que usted no está usando el parche, pero la piel deberá estar limpia y seca antes de pegar el nuevo parche sobre la piel.
- Pueden utilizarse hasta tres parches en forma simultánea dependiendo del área a tratar.



Paso 1: Abra el sachet y saque uno o más parches
Corte el sobre a lo largo de la línea punteada. Saque uno o más parches dependiendo del área dolorosa de su piel (pueden utilizarse hasta tres parches en forma simultánea dependiendo del área a tratar).



Paso 2: Cierre el sachet
Luego de sacar el/los parches cierre el sobre firmemente presionando sobre la cremallera. El parche contiene un gel a base de agua, que se secará si no cierra apropiadamente el sobre. Esto afectaría la adhesión del parche.



Paso 3: Corte el parche, si es necesario
Si lo requiere, puede cortar el parche del tamaño necesario para ajustarlo al área dolorosa. Se debe cortar antes de retirar la lámina despegable. Devuelva al sobre los trozos que no se aplicará y cierre herméticamente el sachet.



Paso 4: Retire la lámina despegable
Retire la lámina despegable transparente del parche. Trate de no tocar la parte pegajosa del parche, para no disminuir la adhesividad.





Paso 5: Aplique el parche y presione
Aplique firmemente sobre la piel. Presione el parche sobre la piel **por al menos 10 segundos** para asegurarse que el parche se pegue firmemente incluyendo los bordes.



Paso 6: Deje puesto el parche sólo en la zona dolorosa por 12 horas
El parche debe permanecer 12 horas en contacto con la piel y luego dejar 12 horas libre, sin parche. El parche que se retira no debe usarse nuevamente y debe descartarse.
Aplicar un nuevo parche luego de 12 horas.

Consejos **Importantes[3]:**



• Prefiera la ducha durante las 12 hrs que **no tiene el parche**



• **Cortar el vello** con tijeras



• Aplicar en **piel sana**



• Piel limpia **y seca**



• 3 parches **como máximo**

versatis®
Parche de lidocaína al 5%

Referencias:
1) Baron R, Mayoral V, Leijon G, et al. 5% lidocaine medicated plaster versus pregab- alin in post-herpetic neuralgia and diabetic polyneuropathy: an open-label, non-inferiority two-stage RCT study. Curr Med Res Opin. 2009; 25(7): 1663-76.
2) Rincón A, Olaya C, Martínez S, et al. Recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo del dolor neuropático (revisión de la literatura). Rev Soc Esp Dolor. 2018; 25(6): 349-58.
3) Resolución Exenta N°15637/13. [Instituto de Salud Pública]. Folleto de información al profesional de Versatis® 5% parche adhesivo medicamentoso. 23 de julio de 2013. Ministerio de Salud, Chile.

Versatis® 5% parche adhesivo medicamentoso. Indicaciones terapéuticas. Versatis está indicado para el alivio sintomático del dolor neuropático asociado con una infección previa por herpes zoster (neuralgia posherpética, NPH). Versatis está indicado para el tratamiento del dolor neuropático localizado (DNL). Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. El parche está también contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a otros anestésicos locales de tipo amida, p. ej., bupivacaína, etidocaína, mepivacaína y prilocaína. No debe aplicarse el parche en piel inflamada o lesionada, como lesiones de herpes zoster activas, dermatitis atópica o heridas. Reacciones adversas. Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Se puede esperar que aproximadamente el 16% de los pacientes experimente reacciones adversas. Se trata de reacciones localizadas que se deben a la naturaleza del medicamento. Las reacciones adversas reportadas más comúnmente eran reacciones en el lugar de administración incluyendo eritema, erupción cutánea, prurito en el lugar de aplicación, ardor en el lugar de aplicación, dermatitis en el lugar de aplicación, eritema en el lugar de aplicación, vesículas en el lugar de aplicación, dermatitis, irritación cutánea y prurito. Son poco probables las reacciones adversas sistémicas después del uso adecuado del parche porque la concentración sistémica de lidocaína es muy baja. Las reacciones adversas sistémicas a la lidocaína son similares en naturaleza a las observadas con otros agentes anestésicos locales de tipo amida. Composición. Cada parche adhesivo de 14 cm x 10 cm contiene 700 mg (5% en p/p) de lidocaína (50 mg de lidocaína por gramo de base adhesiva) Excipientes: Capa autoadhesiva: glicerol, sorbitol líquido, cristalizante, carmelosa sódica, propilenglicol, urea, caolín pesado, ácido tartárico, gelatina, alcohol polivinílico, glicinato de aluminio, edetato disódico, parahidroxibenzoato de metilo, parahidroxibenzoato de propilo, ácido poliacrílico, poliacrilato sódico, agua purificada, Tejido de soporte: Tereftalato de polietileno (PET). Lámina de liberación: Tereftalato de polietileno. Precauciones especiales de conservación. No refrigerar o congelar. Después de primera apertura: Mantener el sobre herméticamente cerrado. Precauciones especiales de desecho. Después del uso, el parche todavía contiene principio activo. Después de la retirada, los parches adhesivos utilizados deben doblarse por la mitad, con el lado adhesivo hacia dentro, de modo que la capa autoadhesiva no esté expuesta, y debe desecharse el parche. Última actualización según Res. Exenta RW N° 15637/13 del 23.07.2013. Si desea recibir la información para prescribir completa de alguno de estos productos, escríbanos a infomedica.cl@grunenthal.com. Si desea reportar cualquier evento adverso favor comunicarse al 800 210 129 o escribanos a drugsafety.cl@grunenthal.com

ALIVIA DONDE DUELE